This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.

+ *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter `http://books.google.com` durchsuchen.

BOSTON MEDICAL
NOV 20 1964
LIBRARY
t.6082





E. Haeckel del.

Wagenschieber sc.

Das

Leben in den grössten Meerestiefen.

Von

Dr. Ernst Haeckel,
Professor in Jena.

Vortrag, gehalten am 2. März 1870 im akademischen Rosensaale zu Jena.

Mit 1 Titelbild in Kupferstich und 3 Holzschnitten.

Berlin, 1870.
C. G. Lüderitz'sche Verlagsbuchhandlung.
A. Charisius.

Das Recht der Ueberſetzung in fremde Sprachen wird vorbehalten.

In den letzten dreizehn Jahren haben die Regierungen von England, von Schweden und von den vereinigten Staaten eine Anzahl von Kriegsschiffen für einen Zweck ausgerüstet, der früher niemals ein Arsenal in Bewegung gesetzt hat. Es galt dabei weder eine kriegerische noch eine diplomatische Mission. Auch handelte es sich nicht um eine von jenen zahlreichen und berühmten Entdeckungs-Reisen, durch welche insbesondere die englische Marine sich um unsere Kenntniß ferner Erdtheile und ihrer Bewohner so hoch verdient gemacht hat. Der Zweck dieser Expeditionen war vielmehr ein ganz anderer und neuer. Es sollten in großartigem Maaßstabe genaue Untersuchungen über die Beschaffenheit des Meeresbodens in den größten Tiefen des Oceans, und über die Spuren von organischem Leben, die etwa dort zu finden seien, angestellt werden.

Die erste Veranlassung zu diesen Untersuchungen gab der elektrische Draht, welcher seit vier Jahren, die Schranken von Raum und Zeit überspringend, Europa und Amerika in den unmittelbarsten geistigen Verkehr gesetzt hat. Um dieses Telegraphen-Kabel legen zu können, mußte zuvor der Grund des atlantischen Oceans bezüglich seiner Tiefe und Bodenbeschaffenheit auf das genaueste geprüft und ausgemessen werden. Als

nun im Jahre 1857 das englische Kriegsschiff Cyclops unter dem Kommando von Capitän Dayman diese Prüfung ausführte, stieß man auf lebendige Thiere in Meerestiefen, die man bis dahin für gänzlich todt und entblößt von allem vegetabilischen und thierischen Leben gehalten hatte. Auch ergab sich bei mikroskopischer Untersuchung des feinen Schlammes, der jene Tiefen bedeckt, daß derselbe zum großen, ja oft zum größten Theile aus zahllosen kleinen Organismen zusammengesetzt sei. Diese überraschende Thatsache regte zu einer eingehenden Untersuchung aller Verhältnisse der größten Meerestiefen und ihrer lebendigen Bewohner an, und führte zu den interessanten Resultaten, von denen mein Vortrag in gedrängter Kürze Bericht abstatten soll.

Die Verbreitung dieser Resultate in weiteren Kreisen erscheint nicht bloß wegen der wichtigen allgemeinen Folgerungen wünschenswerth, die sich daran knüpfen lassen, sondern auch deßhalb, weil sie geeignet sind, lebhafteres Interesse für die außerordentlich interessante Gruppe der niederen Seethiere zu erwekken. Im Ganzen ist unsere nähere Kenntniß von den lebendigen Bewohnern des Meeres überhaupt noch sehr jungen Alters. Obgleich schon Aristoteles, 350 Jahre vor Christi Geburt, in seiner berühmten Naturgeschichte den Seethieren besondere Aufmerksamkeit gewidmet und viele merkwürdige Thatsachen aus ihrem Leben mitgetheilt hatte, blieb dennoch mehr als zwei Jahrtausende hindurch das Interesse an diesen Geschöpfen fast ganz erloschen. Auch der neu belebte Eifer, mit dem im vorigen Jahrhundert die Naturgeschichte der Thiere und Pflanzen wieder in Angriff genommen wurde, berührte die Bevölkerung des Meeres im Ganzen nur wenig. Die vorzugsweise das feste Land bewohnenden Thiere und Pflanzen, namentlich die großen Säugethiere und Vögel, und unter den kleineren Thieren die Insecten, nahmen die Aufmerksamkeit ganz vorwiegend für sich in An-

spruch. Erst in unserem Jahrhundert wandte sich die Wißbegierde der Naturforscher auch den vernachlässigten Meeresbewohnern wieder zu und wurde bald durch eine Fülle der überraschendsten Entdeckungen belohnt. Insbesondere in den letzten dreißig Jahren sind alljährlich Zoologen und Botaniker, mit Mikroskop, Netz und anatomischem Besteck bewaffnet, an die Meeresküste gezogen, und haben die biologische Wissenschaft mit einem wahren Schatze interessanter Thatsachen bereichert. Die früher kaum dem Namen nach gekannten Abtheilungen der Wurzelfüßer, Medusen, Sternthiere, und viele andere niedere Thiergruppen des Oceans stehen in Bezug auf Mannichfaltigkeit und Reiz der Formen und Lebenserscheinungen den landbewohnenden Insecten und Wirbelthieren keineswegs nach; sie übertreffen dieselben sogar in vieler Beziehung. Auch sind von den sieben großen Hauptabtheilungen, in welche die neuere Zoologie das Thierreich eintheilt, nicht weniger als vier zum größten Theile auf das Meer beschränkt; eine derselben lebt ausschließlich im Meere (die Sternthiere oder Echinodermen); und nur zwei Abtheilungen, die Wirbelthiere und Gliederthiere, bilden jenen gegenüber die ganz überwiegende Bevölkerung des Festlandes. Für die wissenschaftliche Zoologie aber, welche nach einem wahren Verständniß der Erscheinungen und nach den bewirkenden Ursachen der biologischen Thatsachen strebt, muß die Kenntniß gerade der niederen Seethiere um so höhere Bedeutung beanspruchen, als diese letzteren vorzugsweise geeignet sind, uns zur Lösung der größten biologischen Räthsel zu führen. Was das Leben ist, wie es entstand, wie es sich entwickelt hat, das lehren uns grade die niedersten und unvollkommensten Bewohner der Meerestiefen; unter ihrer geheimnißvollen Schaar sind auch die Wurzeln der höher entwickelten Thiergruppen verborgen, die uralten Stammformen, aus denen die letzteren sich wahrscheinlich entwickelt haben.

Der allergrößte Theil unſerer Kenntniſſe vom Leben des Meeres beruhte übrigens bis vor wenigen Jahren faſt nur auf denjenigen Beobachtungen, welche an den Bewohnern der Küſten und der Oberfläche des Meeres angeſtellt worden waren. In größere Tiefen war die biologiſche Forſchung bis vor zwanzig Jahren noch nicht vorgedrungen. Es herrſchte ſogar faſt ganz allgemein die Anſicht, daß der Reichthum und die Mannichfaltigkeit der Pflanzen- und Thier-Bevölkerung nur an den Küſten bis in ſehr geringe Tiefen hinab zu finden ſei, und daß mit zunehmender Tiefe das Leben raſch abnehme und endlich vollſtändig aufhöre. Man glaubte, daß der ungeheure Druck der Waſſerſäule, der völlige Mangel an Licht, die fehlende Waſſerbewegung und andere Verhältniſſe der größeren Meerestiefen jede Entwickelung von thieriſchem und pflanzlichem Leben verhindere und ausſchließe.

Allerdings konnte dieſe Vorſtellung ganz gerechtfertigt erſcheinen, angeſichts der gewaltigen Verſchiedenheit, welche die Exiſtenzbedingungen in den größeren Meerestiefen wirklich darbieten. In unſeren Meeren iſt ſchon bei 150 Fuß Tiefe das helle Tageslicht in rothgelbe Dämmerung umgewandelt Schon bei 600 Fuß Tiefe herrſcht abſolute Dunkelheit. In weniger als tauſend Fuß Tiefe iſt auch in den klarſten Meeren und bei dem blendendſten Schein der Tropenſonne jede Spur eines Lichtſchimmers verſchwunden. Wenn man nun bedenkt, wie wichtig das Licht für das organiſche Leben, namentlich der Pflanzen iſt, wie ohne daſſelbe keine Farbe exiſtirt, ſo wird man ſchon aus dieſem Grunde die ewige Nacht der tiefen Abgründe für abſolut lebensfeindlich halten. Dazu kommt die niedere Temperatur des Waſſers in den größeren Tiefen. Obgleich die Angaben der verſchiedenen Beobachter hierüber ſehr abweichen, ſo ſtimmen doch alle darin überein, daß überall in den bedeutenderen Tiefen, min-

deſtens unterhalb 3000 Fuß, die Waſſer-Temperatur entweder auf dem Gefrierpunkt oder doch dieſem ſehr nahe ſteht. Es ſcheint ſogar, daß in den tieferen Abgründen, unterhalb 10,000 Fuß, das Waſſer eine Temperatur unter Null beſitzt, ohne zu gefrieren.

Die eigenthümlichſte Exiſtenzbedingung jedoch, welcher die Organismen in größeren Meerestiefen ausgeſetzt ſind, iſt der ungeheure Druck der auf ihnen laſtenden Waſſerſäule. Dieſer beträgt bereits in einer Tiefe von Eintauſend Fuß 313 Atmoſphären, demnach in 20,000 Fuß 6260 Atmoſphären. Wyville Thomſon giebt davon ein anſchauliches Bild, indem er bemerkt: „Ein Mann in der Tiefe einer engliſchen Meile trägt auf ſeinem Körper ein Gewicht gleich demjenigen von zehn gewöhnlichen Güterzügen, die mit Eiſenſchienen beladen ſind. Da nun eine engliſche Meile etwas über 5000 Fuß lang iſt, die tiefſten gemeſſenen Abgründe aber über ſechs engliſche Meilen tief ſind, ſo würde ein Menſch auf dem Boden dieſer Abgründe einen Druck auszuhalten haben, welche demjenigen von ſechzig ſolcher mit Eiſen beladenen Güterzüge gleich iſt. Genauer ausgedrückt iſt in 32,000 Fuß Tiefe der Druck gleich tauſend Atmoſphären. Jede Atmoſphäre laſtet aber auf einem Quadratfuß Bodenfläche mit einem Gewicht von 2176 Pfund. Es war demnach gewiß ſehr natürlich, daß man die Exiſtenz organiſchen Lebens unter einem ſolchen Drucke bezweifelte. Dieſe Zweifel ſchienen ihre feſte Begründung durch die Unterſuchungen des Engländers Edward Forbes zu gewinnen, des erſten Naturforſchers, welcher mittelſt des Schleppnetzes oder der Dredge die genauere Erforſchung der Fauna und Flora in verſchiedenen Meerestiefen unternahm. Forbes wies nach, daß ſich die Thier- und Pflanzenbevölkerung der Küſten beim Hinabſteigen in die Tiefe ebenſo zonenweiſe veränderе, wie die Fauna und Flora der Gebirge beim Hinaufſteigen in die Höhe. Anderen Tiefenzonen

BOSTON MEDICAL
NOV 20 1964
LIBRARY
t.6082





F. Haeckel del.

Wagenschieber sc.

Das

Leben in den grössten Meerestiefen.

Von

Dr. Ernst Haeckel,
Professor in Jena.

Vortrag, gehalten am 2. März 1870 im akademischen Rosensaale zu Jena.

Mit 1 Titelbild in Kupferstich und 3 Holzschnitten.

Berlin, 1870.
G. G. Lüderitz'sche Verlagsbuchhandlung.
A. Charisius.

andere Seite, mit welcher sie flach auf dem Meeresboden liegen, ist farblos. Offenbar haben diese unsymmetrischen Schollen ihre sonderbare Körperform, durch die sie sich von allen anderen Fischen unterscheiden, durch die Gewohnheit erhalten, sich mit einer Seite, der rechten oder linken, flach auf den Meeresboden zu legen und dabei mit dem halbverdrehten Kopfe nach oben zu schielen. Durch diese eigenthümliche Anpassung ist im Laufe zahlreicher Generationen allmählich die ganze Form des Körpers, und namentlich des Kopfes, unsymmetrisch geworden, und hat sich dann durch Vererbung von der gemeinsamen Stammform der Pleuronectiden auf alle die zahlreichen Arten übertragen, in welche sich späterhin diese Fischfamilie gespalten hat. In frühester Jugend sind übrigens alle Schollen symmetrisch gebaut und erst im Laufe ihres Wachsthums und ihrer individuellen Entwickelung nehmen sie die schiefe und ganz unsymmetrische Gestalt an. Dieser wichtige Umstand erklärt sich aus unserem biogenetischen Grundgesetz[1]), daß die Ontogenesis oder die individuelle Entwickelung eine kurze und schnelle, durch die Gesetze der Anpassung und Vererbung bedingte Wiederholung der Phylogenesis, d. h. der paläontologischen Entwickelung der Vorfahren-Kette des betreffenden Individuums ist. Von den zahlreichen wohlschmeckenden Arten der Pleuronectiden, welche die nordischen Meere massenhaft bevölkern, und von denen namentlich die Steinbutten, Flundern und Seezungen als Delicatessen geschätzt werden, gehen vorzüglich drei Arten an der norwegischen Küste oft in beträchtliche Tiefen hinab: der Nordflunder (Platessa borealis), der Fettbutt (Hippoglossus pinguis) und der Heiligenbutt (H. maximus), welcher letztere eine Länge von fast 7 Fuß erreicht.

Da die meisten von diesen Fischen, welche noch in einer Tiefe von 2000 Fuß leben, große und gefräßige Fleischfresser sind, so läßt sich schon daraus schließen, daß eine entsprechend große

Menge von kleineren Thieren, die ihnen zur Nahrung dienen, ebendaſelbſt leben muß. Und in der That haben die darauf gerichteten neueren Unterſuchungen des Tiefſee-Bodens, vorzüglich von norwegiſchen und ſchwediſchen, ſowie von engliſchen und nordamerikaniſchen Naturforſchern, den ſicheren Beweis geliefert, daß auch noch in Tiefen von 2000—3000 Fuß der Meeresboden, wenigſtens an manchen Stellen, mit lebenden Thieren bedeckt iſt. Insbeſondere nehmen folgende Thierklaſſen an deſſen Bevölkerung Theil: Schwämme und Korallen aus dem Stamm der Pflanzenthiere (Zoophyten oder Coelenteraten); Manteltiere, Ringelwürmer und Sternwürmer aus dem Stamm der Würmer; Krebſe oder Cruſtaceen aus dem Stamm der Gliederthiere oder Arthropoden. Auch verſchiedene Arten von Weichthieren oder Mollusken, ſowohl Muſcheln und Taſcheln, als Schnecken und Kracken, werden mit jenen vermiſcht gefunden. Vorzüglich ſcheint aber der intereſſante Stamm der Sternthiere (Astroda oder Echinoderma) durch zahlreiche und intereſſante Formen in jenen größeren Meerestiefen vertreten zu ſein. Alle vier Klaſſen der Sternthiere ſind hierbei betheiligt: die Seeſterne (Asterida), von deren ſcheibenförmigem Mittelkörper mehrere, gewöhnlich fünf lange Strahlen ausgehen; die Seelilien (Crinoida), deren blumenkelchähnlicher Körper durch einen langen Stiel am Meeresboden befeſtigt iſt; die Seeigel (Echinida), bei welchen der kugelige oder ſcheibenförmige Körper dicht mit Stacheln bedeckt iſt, und die nahverwandten Seegurken (Holothuriae), welche mit ihrem nackten, langgeſtreckt cylindriſchen Körper äußerlich eher großen Würmern als echten Sternthieren gleichen.

Unter dieſen ſchönen Sternthieren der Meerestiefen ſind beſonders zwei nordiſche Formen in mehrfacher Beziehung von hervorragendem Intereſſe, Briſinga und Rhizokrinus. Beide ſind uns durch den berühmten norwegiſchen Naturforſcher Michael

Sars näher bekannt geworden, dessen im letzten Herbste erfolgter Tod ein großer Verlust sowohl für die Wissenschaft im Allgemeinen, als auch im Besonderen für die Erforschung des Lebens in den größeren Meerestiefen war. Sars war ursprünglich Pfarrer auf der Insel Manger unweit Bergen, gewann aber durch die vieljährige Beschäftigung mit den niederen Seethieren eine solche Vorliebe für diese ebenso reizenden als interessanten Geschöpfe, daß er zu ihren Gunsten auf sein einträgliches Pfarramt verzichtete. Je tiefer er in das Leben der Medusen und Korallen, der Sternthiere und Seewürmer eindrang, desto mehr mußte er sich überzeugen, wie dieser unerschöpfliche und untrügliche Quell der natürlichen Offenbarung, und die daraus entspringende Naturreligion, in unlösbarem Widerspruch stehe mit dem Kirchenglauben und den mythologischen Offenbarungen der Schriftgelehrten und Pharisäer. So verzichtete denn der treffliche Sars auf seine Theologie, und um so lieber, als seine abergläubischen Pfarrkinder hinter dem vertrauten Umgange ihres Seelenhirten mit dem Seegewürm, dem nur mit Abscheu von ihnen betrachteten „Troll", eine unheimliche Hexerei witterten und selbst seine Entfernung verlangten. Sars wurde dann als Professor der Zoologie in Christiania angestellt und galt in Europa bald mit Recht als die erste Zierde der norwegischen Universität. In seinen letzten Lebensjahren wurde sein Interesse vorwiegend durch die wunderbaren Bewohner der Tiefe gefesselt, welche die schwarzen Abgründe des Meeres zwischen den Felsen-Labyrinthen der zerrissenen Westküste Norwegens bewohnen. Die zahllosen, tief eingeschnittenen Buchten und Fjorde, welche hier weit in das Land eindringen, die Myriaden von größeren und kleineren Inseln, welche längs dieses zerfetzten Küstensaumes ausgesäet sind, bieten der reichen Entwickelung des marinen Thierlebens ein außerordentlich günstiges Feld. Viele von diesen malerischen Fjorden

und Meerengen sind bei einer sehr geringen Breite, die kaum derjenigen eines großen Flusses gleichkommt, von sehr beträchtlicher Tiefe. Das Urgebirge, das an der norwegischen Westküste ungemein steil 2000—4000 Fuß hoch aus dem Meeresspiegel aufsteigt, erstreckt sich daselbst oft ebenso tief oder noch tiefer unter denselben hinab. An der Oberfläche erscheint das Wasser in Folge der massenhaft einströmenden Gebirgsbäche schwach gesalzen oder fast süß, und ist sehr arm an lebendigen Bewohnern. Die stark gesalzene Tiefe dagegen wimmelt von niederen Thieren. Im Jahre 1868 gab Sars ein Verzeichniß der wirbellosen Thiere, welche er an der norwegischen Küste in einer Tiefe zwischen 1200 und 2700 Fuß gesammelt hatte. Dasselbe enthält nicht weniger als 427 verschiedene Arten, nämlich 106 Krebsthiere, 133 Weichthiere oder Mollusken, 57 Ringelwürmer, 36 Sternthiere, 22 Pflanzenthiere und 73 Urwesen oder Protisten.

Mit besonderer Vorliebe wurde von Sars der Hardanger-Fjord untersucht, jener berühmte Fjord, der an landschaftlicher Schönheit alle anderen übertrifft, der mit den schönsten schweizerischen Alpenseen wetteifert, und wegen seiner herrlichen Buchten und Gebirgsstöcke, seiner großartigen Gletscher und Wasserfälle am meisten von Touristen besucht wird. In seinen Abgründen lebt die schöne und seltene Lima excavata, eine große Muschel mit schneeweißer, zierlich gerippter Schale und mit elegant gefranztem Mantelrand. In ihrer Gesellschaft findet sich die vorher erwähnte Brisinga endecacnemos, ein prachtvoller und sehr merkwürdiger Seestern, der bis jetzt nur im Hardanger-Fjord gefunden worden ist. Als ich im letzten August dort in der Nähe von Utne fischte, hatte ich die Freude, ein lebendes Exemplar dieses herrlichen Thieres, unmittelbar nachdem es aus 1200 Fuß Tiefe heraufgezogen war, bewundern zu können. Diese Brisinga hatte ungefähr eine Elle Durchmesser. Von einer klei-



Fig. 1. Brisinga endecacnemos, der elfarmige Seestern von Hardanger.

nen runden orangerothen Scheibe strahlen elf lange, sehr zierliche Arme aus, welche 13—14 mal so lang sind als der Durchmesser der Scheibe. Die Arme sind prächtig korallenroth mit perlfarbigen Rippen, und auf jeder Seite mit einer dreifachen Reihe von langen Stacheln bewaffnet. Jeder Arm hat die innere Organisation eines gegliederten Wurmes und eigentlich ist der ganze Seestern als ein Stock oder eine Gesellschaft von elf gegliederten Würmern aufzufassen, denen die kleine centrale Scheibe nur als gemeinsamer Vereinigungspunkt und Ernährungs-Centrum

dient. Diese Theorie, welche die historische Entstehung des Sternthierstammes vortrefflich erklärt und die Seesterne als Würmerstöcke deutet, aus denen sich die anderen Sternthierformen erst später durch Centralisation des Stockes entwickelt haben, wird gerade durch die schöne Brisinga vortrefflich gestützt. Ein besonderes Interesse erhält aber die Brisinga noch dadurch, daß sie ein vollkommenes Mittelglied, eine verbindende Uebergangsstufe zwischen den beiden scharf getrennten Gruppen der heute noch lebenden Seesterne darstellt, zwischen den gegliederten Seesternen oder Colastren und den schlangenarmigen Seesternen oder Ophiuren. Indem die Brisinga in ihrem Körperbau die charakteristischen Merkmale beider Gruppen vereinigt, zeigt sie sich als einen wenig veränderten, directen Nachkommen jener uralten und längst ausgestorbenen Seestern-Form, welche den Uebergang von älteren Gliedersternen (Colastra) zu den jüngeren Schlangensternen (Ophiurae) bildete und die Stammform der letzteren wurde.

Ein ähnliches historisches Interesse knüpft sich an das zweite vorher genannte Sternthier, welches in den tiefen Abgründen der nordischen Meere lebt und welches von dem Sohne von Sars erst vor vier Jahren bei den Lofoten-Inseln in einer Tiefe von 1800 Fuß entdeckt wurde. Das ist der Rhizocrinus lofotensis, ein zierliches Astrod aus der Klasse der Seelilien. Die Seelilien oder Crinoiden gleichen einem fünfstrahligen Seestern mit gefiederten Armen. Sie kriechen aber nicht, gleich den Seesternen, frei auf dem Meeresboden umher, sondern sind auf einem schlanken gegliederten Stiele festgewachsen, wie eine einblüthige Lilie. In einer früheren Periode der Erdgeschichte, vor vielen Millionen Jahren, bedeckten diese Seelilien den Meeresboden in einer großen Menge und Mannichfaltigkeit von schönen Formen. Sie bildeten im Verein mit den blumengleichen Korallen bunte Wiesen, auf denen die dichterische Phantasie die lilienarmige

Meeresgöttin Thetis und ihre anmuthigen Gefährtinnen ihre Tänze aufführen lassen konnte. Gegenwärtig jedoch, und schon seit langer Zeit, ist die formenreiche Klasse der Seelilien beinahe ausgestorben und nur wenige Arten, welche fast alle einer einzigen Gattung angehören, haben bis heute den Kampf um's Dasein glücklich bestanden. Der norwegische Rhizokrinus aber, welcher neuerdings auch an anderen Stellen des nordatlantischen Oceans, in der Nähe der schottischen und der nordamerikanischen Küsten, in großen Tiefen gefunden worden ist, gehört zu einer Familie von Seelilien, welche man seit vielen Jahrtausenden ausgestorben glaubte. Die Ueberraschung über die Thatsache, daß ein vereinzelter Nachkomme jener fossilen Crinoiden noch heute in der Abgeschiedenheit der schwarzen Meerestiefen sein einsames Dasein fristet, war daher nicht gering.

Außer dem Rhizokrinus und der Brisinga hat man in der neuesten Zeit in Tiefen von 2000 Fuß und darüber noch eine Anzahl von anderen merkwürdigen Thieren verschiedener Klassen entdeckt, welche alle durch ihren gesammten Körperbau ein sehr hohes Alter bekunden und weniger der Gegenwart, als der vor Millionen von Jahren entschwundenen Primär-Periode der Erdgeschichte, der Steinkohlenzeit und der permischen Periode, anzugehören scheinen. Sie sind näher den damals lebenden, als den heutigen Vertretern derselben Thierklassen verwandt, gleichsam „lebende Fossile". Offenbar konnten diese trägen Geschöpfe an der Oberfläche des Meeres und im Lichte der Sonne, wo der lebhafte Kampf um's Dasein beständig die mannichfaltige Bevölkerung zur Arbeitstheilung und zu fortschreitender Entwickelung anspornte, die lebhafte Concurrenz mit ihren immer mehr sich vervollkommnenden Verwandten und Nachkommen nicht mehr bestehen. Die natürliche Züchtung trieb die conservativen Herren tiefer und tiefer in das unergründliche Dunkel der stillen Ab-

gründe hinab. Hier können sie noch jetzt, getrennt vom hellen Lichte und bunten Leben der Oberfläche, in stiller Abgeschiedenheit ihr beschauliches Leben weiter führen und von der guten alten Zeit der Steinkohlen-Wälder und des rothen Sandsteins träumen. Möchten doch auch die conservativen Klassen der menschlichen Gesellschaft diesem löblichen Beispiele folgen und sich, wenn auch nicht in die Tiefen des Meeres, doch in die einsamen Wüsten oder Gebirgs-Einöden zurückziehen. Sie würden dann wenigstens der fortschreitenden Entwickelung des nach Vervollkommnung strebenden Theiles der Menschheit keine Hindernisse mehr in den Weg legen können!

Während man von der Existenz einzelner der angeführten Thierformen in Tiefen von 1000—2000 Fuß schon seit langer Zeit wußte, so sind dagegen die ersten sicheren Beobachtungen über thierisches Leben in viel größeren Tiefen erst vor wenigen Jahren bekannt geworden. Im Jahre 1861 wurde aus dem Mittelmeere das abgerissene Ende eines Telegraphen-Kabels gehoben, welches die Verbindung zwischen Cagliari auf der Insel Sardinien und Bona in Afrika vermittelt und zwei Jahre lang in einer Tiefe von 6000—8500 Fuß gelegen hatte. Dasselbe war mit einem Dutzend verschiedener Arten von lebenden Muscheln, Schnecken, Würmern, Sternthieren und Korallen bedeckt. Mehrere von diesen, namentlich Korallen, kannte man bis dahin nur in versteinertem Zustande aus tertiären Gebirgsschichten der Mittelmeerküste, ebenfalls „lebende Fossile".

In demselben Jahre (1861) wurden in dem nördlichen Eismeere, in der Nähe von Spitzbergen, zahlreiche Tiefgrund-Untersuchungen von einer schwedischen Expedition von Naturforschern angestellt, welche unter Thorell's Leitung stand. Die Dredsche-Versuche erstreckten sich bis zu derselben Tiefe, in welcher das Telegraphen-Tau zwischen Cagliari und Bona gelegen hatte.

Auch hier fanden sich noch in einer Tiefe von 6000—8400 Fuß zahlreiche lebende Organismen, größtentheils allerdings mikroskopisch kleine Urwesen aus der Klasse der Polythalamien, dazwischen aber auch größere Thierformen verschiedener Klassen, insbesondere mehrere Arten von Würmern und Krebsthieren, ferner Mollusken, Sternthiere und Schwämme. Noch reicher war die Ausbeute der vierten schwedischen Expedition nach Spitzbergen, welche 1868 unter der Leitung von Nordenskiöld ausgeführt wurde. Hier wurden zahlreiche wirbellose Thiere noch in Tiefen von 4000—6000 Fuß, einzelne aber sogar noch in Tiefen bis über 12,000 Fuß angetroffen. In den Tiefen zwischen 6000 und 12,000 Fuß und darüber war der ganze Meeresboden mit dem merkwürdigen Bathybius-Schlamm bedeckt, den wir sogleich noch näher ins Auge fassen werden.

Aehnliche Resultate erhielten in den letzten drei Jahren die von der nordamerikanischen und englischen Regierung ausgerüsteten Expeditionen. Die amerikanischen Untersuchungen, an denen der Zoologe Pourtales Theil nahm, geschahen hauptsächlich an der Küste der Halbinsel Florida. Die englischen Expeditionen, bei denen drei Zoologen, Carpenter, Wyville Thomson und Gwyn Jeffreys thätig waren, bewegten sich theils in der Gegend der Far-Oer-Inseln und des nördlichen Schottlands, theils in der Bucht von Biscaya. Hierbei muß nochmals rühmend die außerordentliche Liberalität hervorgehoben werden, mit welcher die englische, die schwedisch-norwegische und die nordamerikanische Regierung diese Expeditionen ausrüsteten und den dabei betheiligten Naturforschern alle erwünschten Mittel zur Verfügung stellten; Alles für einen rein wissenschaftlichen Zweck. Von unsern deutschen Regierungen ist leider ein Gleiches noch nicht zu sagen. Nur die österreichische Regierung, welche schon mehrfach ihre Kriegsschiffe für naturwissenschaftliche Expeditionen

verwerthete, hat in neueſter Zeit eine Expedition für Tiefſee-Unterſuchungen im Mittelmeere ausgerüſtet. In unſerem Norddeutſchen Bundesſtaate iſt von einer derartigen Verwendung der Marine für naturwiſſenſchaftliche Werke noch keine Rede, obwohl die Kriegsſchiffe in Friedenszeiten keine paſſendere und nützlichere Verwerthung finden könnten. Rückſichtslos verzehrt bei uns der ungeheure Militär-Aufwand für ſich allein die reichen Mittel, welche in anderen Ländern zur Förderung von Wiſſenſchaft und Kunſt, von Unterricht und Bildung verwendet werden. Sei aber wenigſtens hierbei noch die Bemerkung geſtattet, daß trotzdem, trotz aller mangelnden Unterſtützung von Seiten der größten norddeutſchen Regierung, die deutſchen Naturforſcher ſich faſt in allen Zweigen an der Spitze des Fortſchritts erhalten und namentlich auch um unſere Kenntniß des Meereslebens hoch verdient gemacht haben. Alljährlich geht ſeit langer Zeit eine Zahl von deutſchen Zoologen, mit Mikroſkopen und Netzen ausgerüſtet, an die Meeresküſte und iſt um die Erforſchung der niederen Seethiere, die nach ſo vielen Richtungen der Biologie Licht verbreiten, unermüdlich bemüht. Und obgleich uns die glänzende Ausſtattung und die reichen Hilfsmittel unſerer engliſchen und ſcandinaviſchen Mitarbeiter abgehen, obgleich wir alle dieſe marinen Expeditionen aus unſeren dürftigen privaten Mitteln beſtreiten, nur bisweilen von einer kleineren deutſchen Regierung unterſtützt, die ihren Ruhm in der Förderung wiſſenſchaftlicher Beſtrebungen ſucht, dürfen wir dennoch beanſpruchen, für die intenſive Erforſchung des marinen Thierlebens viele der beſten, ja im Verhältniß die fruchtbarſten Beiträge geliefert zu haben. Es genügt dafür, den Namen Johannes Müller's und ſeine zahlreichen Schüler anzuführen.

Die vorher angeführten Thatſachen, daß ein verhältnißmäßig reiches und mannichfaltiges Thierleben noch in 2000 und ſelbſt

3000 Fuß Tiefe existirt, daß zahlreiche wirbellose Thiere bis zu 6000 und 8000 Fuß und einige wenige sogar noch bedeutend tiefer hinabsteigen, sind übrigens keineswegs das wichtigste Resultat, welches die vervollkommneten Tiefgrund-Untersuchungen der letzten Jahre geliefert haben. Ungleich wichtiger und interessanter sind vielmehr die überraschenden Entdeckungen, zu welchen die Erforschung des Meeresbodens in größeren Tiefen, zwischen 10,000 und 30,000 Fuß, geführt hat.

Wenn auch einzelne niedere Thiere, namentlich Schwämme, Korallen und Würmer, hie und da bis zu 10,000 oder sogar 12,000 Fuß hinabsteigen, so scheint dies doch nur eine seltene Ausnahme zu sein. In den Meerestiefen unterhalb 10,000 Fuß und namentlich in den ungeheuren Abgründen zwischen 20,000 und 30,000 Fuß scheint gewöhnlich *für das unbewaffnete Auge* alles Leben gänzlich erloschen zu sein. Ein ganz anderes Resultat aber offenbart uns hier das Mikroskop. Gerade in diesen scheinbar lebloſen Abgründen ist der Meeresboden mit einer dichten Decke von sehr zahlreichen, dem bloßen Auge unsichtbaren Organismen überzogen, und zwar in einer solchen Fülle, daß der Boden selbst gewissermaßen lebendig ist. Gerade diese höchst merkwürdige Thatsache und die daran sich knüpfenden wichtigen Folgerungen verleihen jenen Tiefgrund-Forschungen ihre außerordentliche Bedeutung.

Der Boden jener größeren Meerestiefen, und zwar allgemein, wie es scheint, zwischen 5000 und 25,000 Fuß, oft aber schon zwischen 3000 und 5000 Fuß, ist mit einem Schlamm oder Mulder (Mud, Ooze) von höchst merkwürdiger Beschaffenheit bedeckt. Dieser Schlamm, den wir wegen des wichtigsten darin vorkommenden Organismus kurz *Bathybius-Schlamm* nennen wollen, findet sich in ganz gleicher Beschaffenheit an allen Stellen der Erde, an denen man bis jetzt so bedeutende Tiefen

sondirt hat. Er bedeckt namentlich in einer zusammenhängenden Schicht das sogenannte „Telegraphen-Plateau". Das ist eine ungeheure Tiefsee-Ebene, welche sich mit einer durchschnittlichen Tiefe von 12,000 Fuß von Irland durch die ganze Breite des nord-atlantischen Oceans hindurch bis nach Nord-Amerika erstreckt, und im Süden gegen die Azoren hin in noch bedeutend größere Tiefen sich hinabsenkt. Dieses ganze ausgedehnte Telegraphen-Plateau scheint mit Bathybius-Schlamm überzogen zu sein.

Bathybius ist ein griechisches Wort und bedeutet: „in der Tiefe lebend". Der Bathybius-Schlamm ist in der That lebendiger Schlamm der Meerestiefen. Zuerst wurde dieser Schlamm im Jahre 1857 von Capitän Dayman, dem Kommandanten des englischen Kriegsschiffes Cyclops, empor gebracht, und von dem ersten englischen Zoologen, Professor Huxley, genau untersucht. Die von ihm gewonnenen Resultate wurden 1860 von Dr. Wallich bestätigt, welcher die atlantische Soundirungs-Expedition des Kriegsschiffes Bulldog unter dem Kommando von Mc. Clintock begleitete. Auch die Mikroskopiker, welche späterhin den Bathybius-Schlamm untersuchten, namentlich im letzten Sommer Professor Carpenter und Wyville-Thomson, haben Huxley's Angaben im Wesentlichen bestätigt. Ich selbst erhielt im vorigen Herbst eine Probe von Bathybius-Schlamm durch die Güte meines verehrten Collegen, Herrn Professor Preyer. Es war eine Probe des atlantischen Schlammes, welche am 22. Juli 1869 von Carpenter und Thomson aus 2435 Faden (14,610 Fuß) Tiefe an Bord des „Porcupine" gehoben worden war (in 47° 38" nördlicher Breite, 12° 4" östlicher Länge). Der Schlamm war sorgfältig in einem Glase mit Weingeist aufbewahrt und bestätigte mir bei der genauesten mikroskopischen und chemischen Untersuchung

alle die merkwürdigen Reſultate, welche Profeſſor Huxley in ſeiner letzten ausführlichen Mittheilung über den Bathybius (1868) veröffentlicht hatte. [2])

Der Bathybius-Schlamm erſcheint in feuchtem Zuſtande für das bloße Auge als ein äußerſt feinkörniger, zähflüſſiger Brei von blaß graubrauner oder gelblich grauer Farbe, in welchem gröbere Formbeſtandtheile gar nicht ſichtbar ſind. Seine auffallendſte Eigenſchaft iſt ein ſehr hoher Grad von Klebrigkeit. Schon der erſte Beobachter, Capitän Dayman, bemerkt in dieſer Beziehung: „Die weiche, mehlige Subſtanz, welche den Boden des ganzen Telegraphen-Plateaus bedeckt, iſt merkwürdig zähe und klebrig, ſo daß ſie an dem Tau und Loth des Senkapparates feſt hängen bleibt, auch wenn letzterer beim Heraufziehen durch eine Waſſerſäule von mehr als 12,000 Fuß hindurch paſſiren muß.“ Auch an meiner in Weingeiſt conſervirten Probe war dieſe auffallende Klebrigkeit, die man mit derjenigen von recht dickflüſſigem Honig vergleichen kann, vollſtändig erhalten. Wenn man den Schlamm trocknet, erſcheint er als ein grauweißes, ſchwer zerreibliches, feines kreideartiges Pulver, das man leicht mit dem gewöhnlichen Kalkſtaube unſerer Chauſſeen verwechſeln könnte. Bringt man aber nur ein Nadelſpitzchen von dem Schlamm unter das Mikroſkop, ſo wird man durch den Anblick einer ungeheuren Menge von größeren und kleineren, zierlich geformten Körperchen überraſcht. Die Mehrzahl unter den größeren Körperchen ſind ſogenannte Globigerinen, kalkſchalige Wurzelfüßer oder Rhizopoden aus der Polythalamien-Gruppe [3]). (Vergl. im Titelbilde Fig. g 1—g 6 und h 1—h 3). Ihr weicher Körper beſteht aus weiter Nichts, als aus einem kleinen Klümpchen von jenem hochwichtigen Urſchleim oder Protoplasma, den wir ſogleich noch näher ins Auge faſſen müſſen. Das kleine Schleimklümpchen iſt von einer mehrkammrigen



Fig. 2. Eine lebende Globigerine mit einer aus vierzehn Kammern zuſammengeſetzten Kalkſchale und mit ausgeſtreckten Pſeudopodien (verzweigten und verſchmelzenden Fäden von Urſchleim oder Protoplasma).

Kalkſchale umſchloſſen. Die Schalenkammern, ſpiralig um eine Axe aufgerollt, ſind faſt kugelig. Ihre Wand iſt von ſehr feinen Löchern ſiebartig durchbrochen, aus denen äußerſt zarte Fäden hervorgeſteckt werden. Dieſe Fäden, unmittelbare Verlängerungen der ſchleimigen Körperſubſtanz, ſind die einzigen Organe des kleinen Weſens, mit welchen daſſelbe kriecht, frißt und empfindet.[3]) Neben den Globigerinen finden ſich in dem Bathybius-Schlamm auch noch andere verwandte Rhizopoden, obwohl ſeltener. Im Titelbilde iſt eine ſolche, Textilaria benannte Polythalamie bei i abgebildet. Zwiſchen den Polythalamien zerſtreut liegen zahlreiche Radiolarien, die

ſich durch ſehr mannichfaltig geformte und zierliche Kieſelſchalen auszeichnen.[4]) Zwei ſolche Radiolarien oder Strahl-Rhizopoden ſind auf dem Titelkupfer abgebildet, links oben (bei e) eine gegliederte helmförmige Gitterſchale mit aufgeſetzter Stachelſpitze (Eucyrtidium), rechts in der Mitte (bei f) eine kugelige Kieſelſchale mit 6 radialen Stacheln (Haliomma). Auch ziemlich viele Diatomeen, oder Kieſelzellen, finden ſich im Bathybius-Schlamme vor. Die meiſten gehören zu der Gattung Coscinodiscus und bilden eine kreisrunde Kieſelſcheibe mit regelmäßig parquetirter Oberfläche (Fig. d im Titelbilde). Von den Diatomeen, ſowie von den zierlichen Radiolarien, iſt es ſehr wahrſcheinlich, daß ſie größtentheils (wenn nicht ausſchließlich) Bewohner der Meeresoberfläche ſind, deren unzerſtörbare Kieſelſkelete erſt nach ihrem Tode auf den Meeresboden herabſinken. Von den Globigerinen dagegen und von dem Bathybius iſt dieſe Annahme nicht zuläſſig. Dieſe beiden Organismen ſind die eigentlichen Bewohner der Abgründe. Der Zahl nach bilden übrigens die Hauptmaſſe der Schlamm-Beſtandtheile nicht die angeführten Rhizopoden, ſondern viel kleinere runde Scheiben von Kalkerde, die Coccolithen, und ſodann eine erſtaunlich große Menge unregelmäßiger Klumpen von freiem Urſchleim oder Protoplasma. Das iſt Huxley's Bathybius Haeckelii.

Bevor wir nun die Bathybius-Klumpen und die dazu gehörigen Coccolithen näher betrachten, müſſen wir nothwendig noch ein paar Worte über die Sachen bemerken, die ſich nicht im Bathybius-Schlamme vorfinden. Man ſollte erwarten, in dieſem, wie in dem gewöhnlichen Grunde des flacheren Meeres, eine Menge von ganzen und zertrümmerten Skelettheilen der gemeinen und überall verbreiteten Seethiere zu finden. Die unverweslichen und ſchwer zerſtörbaren Kalkſchalen der Muſcheln und Schnecken, Kalkpanzer von Seeſternen und Seeigeln, Kalkröhren von

Würmern und Kalkstöcke von Korallen, ferner Knochen und Zähne von Fischen, findet man allenthalben an den flacheren Meeresstellen auf dem Boden zerstreut vor. Von allen diesen harten Formbestandtheilen höherer Thiere findet sich in dem Bathybius-Schlamme entweder keine Spur, oder nur hie und da zufällig ein einzelnes verlorenes Stückchen. Selbst die Kieselnadeln von Schwämmen, die sonst überall im Meere zerstreut vorkommen, sind nur selten und einzeln zu finden. Gänzlich fehlt ferner jede Spur von einem pflanzlichen Organismus. Auffallend ist endlich die verhältnißmäßig sehr geringe Menge von kleinen Gesteins-Trümmern, Krystallen und anderen anorganischen Körperchen.

Was sind und was bedeuten nun aber jene vorher angeführten, mikroskopisch kleinen Organismen, welche die Hauptmasse des lebendigen Bathybius-Schlammes bilden? Wenn es keine Pflanzen sind, müssen es doch wohl Thiere sein! Die vorsichtigste Antwort hierauf lautet: Nein! Alle jene kleinen Lebewesen, welche zu unzähligen Milliarden zusammengedrängt den tiefsten Meeresboden bevölkern, und welche gewissermaßen eine lebendige Bodendecke in den tiefsten, bisher für leblos gehaltenen Abgründen des Oceans bilden, alle jene Globigerinen und Radiolarien, Coccolithen und Protoplasma-Körper, gehören zu einer Gruppe von niedersten und unvollkommensten Wesen, welche weder echte Thiere noch echte Pflanzen sind, und welche man daher am besten vorläufig in dem neutralen Zwischenreiche der Urwesen oder Protisten vereinigt.

Die Unterscheidung von Thier und Pflanze ist kinderleicht bei allen höher entwickelten Formen der beiden großen organischen Reiche. Je tiefer wir aber in beiden Reichen auf der großen Stufenleiter der Entwickelung hinabsteigen, desto mehr verwischen und vermengen sich die bezeichnenden Charaktere, die wesentlichen

Eigenschaften, durch welche Jedermann mit Leichtigkeit Thier und Pflanze glaubt unterscheiden zu können. Zuletzt stoßen wir tief unten auf eine große Anzahl von vielgestaltigen, meist dem bloßen Auge unsichtbaren Organismen, über deren Thier- oder Pflanzen-Natur von den Naturforschern ein unendlicher und unlöslicher Streit geführt wird. Diese neutralen Urwesen sind eben in der That weder Thiere, noch Pflanzen; sie sind Protisten.

Es ist hier nicht der Ort, die schwierige Frage von den Grenzen des Thier- und Pflanzenreichs, und von der neutralen Stellung des Protisten-Reiches mitten zwischen Beiden, zu erörtern.[5]) Doch müssen wir nothwendig zum Verständniß des Folgenden ein paar Worte über die fundamentale Uebereinstimmung im Körperbau der drei organischen Reiche hier einschalten. Bekanntlich gilt als das gemeinsame Form-Element, als der einfache Baustein, aus dem der Körper aller Thiere und Pflanzen aufgebaut ist, die sogenannte Zelle. Seit 30 Jahren wissen wir, daß jeder höhere Organismus aus sehr zahlreichen, aus Tausenden oder Millionen von Zellen zusammengesetzt ist. Diese entstehen durch wiederholte Theilung aus der einfachen einzelnen Zelle, welche jedes Thier und jede Pflanze im Beginne ihrer individuellen Existenz bildet. Das Thier-Ei sowohl als das eigentliche Pflanzen-Ei ist weiter Nichts als eine einfache Zelle. Es giebt aber auch eine Anzahl von niederen Organismen, welche zeitlebens auf dieser Stufe der einfachen Zelle stehen bleiben.

Obwohl die verschiedenen Zellen nicht allein bei den verschiedenen Arten von Organismen, sondern auch an den verschiedenen Körpertheilen eines und desselben Organismus an Form, Größe und Zusammensetzung höchst mannichfaltig geartet sind, so sind dennoch diese zahllosen Unterschiede erst durch Anpassung erworben. Ursprünglich sind alle Zellen gleich gebildet und bestehen im Wesentlichen aus einem weichen Schleimklümpchen,

das einen festeren rundlichen Kern einschließt; im Groben ungefähr vergleichbar einer geschälten Kirsche oder Pflaume. Sehr häufig, aber nicht immer, wird späterhin dieses nackte weiche Klümpchen oder Klößchen von einer äußeren festen Hülle, einer „Zellenmembran", umschlossen. Dann besteht die Zelle (vergleichbar einer ganzen, ungeschälten Kirsche oder Pflaume) aus drei verschiedenen Bestandtheilen: aus festflüssigem Zellstoff, äußerer Hülle und innerem Kern. Sowohl der Kern oder Nucleus, als auch der Zellstoff oder das Protoplasma gehören in stofflicher Beziehung zu jener Gruppe von Körpern, welche die Chemiker Eiweißkörper (Albuminate) oder Proteïnkörper nennen. Das sind die wichtigsten von allen Substanzen, welche wir kennen. Denn sie sind die Träger, wenn nicht die Factoren, der sogenannten „Lebenserscheinungen", und überall, wo wir an einem Naturkörper Ernährung und Fortpflanzung, Bewegung und Empfindung wahrnehmen, erscheint als die active Grundlage dieser Lebenserscheinungen ein eiweißartiger oder schleimartiger Körper, und zwar immer von jener Art der Zusammensetzung, welche dem Protoplasma eigenthümlich ist.

Die ältere Naturphilosophie im Anfange unseres Jahrhunderts, an ihrer Spitze der geniale Oken, hatte die Behauptung aufgestellt, daß alles Lebendige aus einer weichen, eiweißartigen Masse, dem sogenannten Urschleim, hervorgegangen sei. Die Eigenschaften, welche jene Naturphilosophen ihrem berüchtigten Urschleime zuschrieben, sind im Wesentlichen dieselben, welche die spätere Erfahrung uns an dem Protoplasma kennen gelehrt hat. Die verrufene „Urschleimtheorie" Oken's hat durch die berühmte „Protoplasmatheorie" Max Schultze's, die gegenwärtig das feste Fundament für unsere ganze biologische Erkenntniß bildet, gewissermaßen ihre eingehende Begründung erfahren. Thatsache ist, daß bei allen Organismen ohne Aus-

nahme die Lebenserscheinungen an einen bestimmten Stoff geknüpft sind. Dieser Lebensstoff ist zwar im Einzelnen unendlich mannichfaltig, aber im Wesentlichen doch immer gleichartig zusammengesetzt, und stellt eine Verbindung von vier Elementen dar, von Kohlenstoff, Sauerstoff, Wasserstoff und Stickstoff. Oft kommt dazu als fünftes Element noch Schwefel. Im Grunde ist es sehr gleichgültig, ob wir diese Verbindung mit der älteren Naturphilosophie als Urschleim oder Lebensstoff, oder mit der neueren Biologie als Sarcode oder Protoplasma bezeichnen. Der Ausdruck Urschleim ist insofern nicht glücklich gewählt, als man bei Schleim gewöhnlich an eine sehr wasserreiche und zerfließliche Substanz denkt. Allerdings ist das lebende Protoplasma immer weich oder festflüssig, indem stets eine mehr oder minder ansehnliche Wassermenge die stickstoffhaltige Kohlenstoff-Verbindung durchtränkt und aufgequollen erhält. Allein während in manchen Fällen das Protoplasma so dünnflüssig wie gewöhnlicher Schleim ist, erscheint es dagegen in anderen Fällen so dicht und fest, wie ein Stück Kautschuk oder Leder. Bezeichnender wäre daher eigentlich der Ausdruck Bildungsstoff.

Auch bei allen Protisten, wie bei allen Thieren und Pflanzen, ist der einzige wesentliche und niemals fehlende Körperbestandtheil dieser Bildungsstoff, der Urschleim oder das Protoplasma. Alle übrigen Stoffe, die sonst noch im Organismus vorkommen, sind erst vom Urschleim producirt oder abgeleitet. Wir stoßen aber bei vielen Protisten auf die sehr wichtige Thatsache, daß sie noch nicht einmal den Formwerth einer einfachen Zelle haben, indem ihnen jede Spur von Kern fehlt. Der ganze lebendige Leib besteht hier bloß aus structurlosem Urschleim ohne Kerne, und kann daher auch nicht als echte Zelle, sondern nur als Cytode, d. h. als zellenähnlicher Elementar-Organismus bezeichnet werden. Die Zellen und die Cytoden sind

demnach zwei verschiedene Arten oder richtiger Stufen von elementaren Organismen, oder von lebendigen Individuen erster Ordnung. Wir können diese beiden Stufen von Lebenseinheiten unter dem Namen der Bildnerinnen oder Plastiden zusammenfassen. Denn sie allein bilden und bauen in der That alle belebten Naturkörper auf. Die kernlosen Cytoden sind die niedere und ursprüngliche Stufe, die kernhaltigen Zellen dagegen die höhere und entwickeltere Stufe der Plastiden.[6])

Cytoden oder kernlose Plastiden sind nun auch die vorher genannten Globigerinen, welche die Mehrzahl von den größeren geformten Körperchen des Tiefseegrundes bilden. Ihr Körperchen besteht bloß aus der mehrkammerigen Kalkschale und dem darin eingeschlossenen Urschleim. Aehnliche Cytoden sind auch die übrigen Polythalamien, deren mikroskopisch kleine Kalkschalen sich oft in solchen Massen auf dem Meeresboden anhäufen, daß sie allein bei später eintretender Hebung des Bodens ganze Gebirge zusammensetzen, so z. B. des Nummulitengebirge an den Küsten des Mittelmeeres, die Steine, aus denen die egyptischen Pyramiden aufgebaut sind.

Es giebt aber noch einfachere und unvollkommnere Protisten, als diese Polythalamien. Das sind die merkwürdigen Moneren, die denkbar einfachsten unter allen lebendigen Wesen.[7]) Das griechische Wort Moneres bedeutet „Einfach". Ihr ganzer Körper besteht zeitlebens einzig und allein aus einem nackten, structurlosen Klümpchen von beweglichem Urschleim, selbst ohne die schützende Kalkhülle der Polythalamien. Man kennt diese wunderbaren Urwesen erst seit sechs Jahren. Sie scheinen aber in den süßen Gewässern sowohl als im Meere keineswegs selten zu sein, und sind wahrscheinlich sogar sehr weit verbreitet. Eigentlich verdienen diese einfachsten Lebewesen kaum noch die

Bezeichnung von Organismen. Denn sie besitzen keine Spur von Organen, keine Spur von verschiedenartigen Körpertheilen. Und dennoch wachsen die Moneren und ernähren sich, dennoch sind sie reizbar und empfindlich; dennoch bewegen sie sich und pflanzen sie sich fort. Der structurlose Urschleim ist hier Alles in Allem. Der Theil ist gleich dem Ganzen. Denn wenn man ein Moner in mehrere Stückchen zerschneidet, so lebt jedes Stückchen gleich eben so gut weiter, wie das ganze Urschleim-Klößchen. Eine bestimmte Form besitzen sie auch nicht, sondern ändern dieselbe fortwährend, indem sie sich bewegen. Im Ruhezustand sind sie meist kugelig abgerundet. Die Fortpflanzung erfolgt in der einfachsten Weise, indem das Protoplasma-Körperchen entweder in zwei Hälften oder in eine größere Anzahl von Stückchen zerfällt, jedes von denselben Eigenschaften, wie das mütterliche Urwesen. Die Moneren liefern uns so den unwiderleglichen Beweis dafür, daß die Lebenserscheinungen nicht an einen maschinenartig zusammengesetzten Körper gebunden sein müssen, sondern an eine bestimmte chemische Konstitution der Materie, an das formlose Protoplasma. Die Organisation oder die scheinbar zweckmäßige Zusammensetzung des Körpers aus verschiedenartigen Theilen ist nicht die Ursache, sondern die Wirkung des Lebens, das secundäre Product der Wechselwirkung von Vererbung und Anpassung![7])

Zu diesen wunderbaren Moneren gehört nun auch der merkwürdige Bathybius, das wichtigste von allen Protisten, welche die Abgründe des Meeres beleben. Wie schon erwähnt, hat Hurley mit diesem Namen die freien, nackten Protoplasma-Klumpen bezeichnet, die in erstaunlicher Menge in dem Tiefseegrunde vorkommen, und denselben neben den Globigerinen wesentlich zusammensetzen. Es sind unregelmäßig gestaltete Ur-

schleim-Körper von sehr verschiedener Größe, die größten mit bloßem Auge als Pünktchen sichtbar. (Auf dem Titelkupfer sind diese Bathybius-Cytoden mit a und b bezeichnet. In Fig. a 1 bis a 4 und b 1—b 3 sind unregelmäßige (amoebenförmige) Urschleimstücke abgebildet, in Fig. a 9 und b 4 netzförmige Stücke. Die mit b bezeichneten Cytoden enthalten Coccolithen, die mit a bezeichneten dagegen nicht.) Ihr chemisches Verhalten beweist ihre Protoplasma-Natur unzweifelhaft. Auch haben Carpenter und Thomson im letzten Sommer an dem eben heraufgeförderten Bathybius-Schlamme die charakteristischen Bewegungserscheinungen des Urschleims wahrgenommen. In dem von mir untersuchten Tiefseegrunde sind die Bathybius-Klößchen in solcher Menge zusammengehäuft, daß sie etwa ½—⅓ der ganzen Masse bilden, eine Thatsache von außerordentlicher Bedeutung. Diese Protoplasma-Haufen scheinen auch die einzige Ursache der merkwürdigen Klebrigkeit zu sein, durch welche sich der Tiefseegrund von gewöhnlichem Schlamm so auffallend unterscheidet.

Vor den übrigen Moneren zeichnet sich Bathybius dadurch aus, daß er bei seinem Stoffwechsel kleine Körperchen von kohlensaurem Kalk ausscheidet. Das sind die schon erwähnten Kernsteine oder Coccolithen, die zahlreichsten unter allen kleineren Formbestandtheilen des Tiefseegrundes. (Im Titelbilde Fig. c 1 bis c 4.) Ihr Entdecker, Huxley, nannte sie zuerst (1858) Coccolithen, unterschied aber zehn Jahre später (1868) als zwei verschiedene Formen derselben die Diskolithen und Cyatholithen. Die Diskolithen oder Scheibensteine sind einfache, kreisrunde oder elliptische Scheiben von kohlensaurem Kalk, concentrisch geschichtet wie Stärkemehl-Körnchen (Fig. Aa, Ab, S. 36). Die Cyatholithen oder Napfsteine sind aus zwei eng verbundenen Scheiben zusammengesetzt, von denen meistens die kleinere eben, die größere convex vorgewölbt ist. Daher besitzen sie genau die Form



Fig. A. Ein Diskolith oder Scheibenstein, a von der Fläche, b vom Rande.
Fig. B. Ein Cyatholith oder Napfstein, a von der Fläche, b vom Rande.
Fig. C. Eine Kernkugel oder Coccosphäre.

von gewöhnlichen Hemdenknöpfchen oder Manschettenknöpfchen (Fig. Ba, Bb). Zwischen den ungeheuren Massen derselben kommen einzeln auch Kugeln vor, welche aus mehreren solchen Scheiben zusammengesetzt erscheinen: Kernkugeln oder Coccosphären (Fig. C). Alle diese geformten Kalkkörperchen scheinen lediglich Ausscheidungsproducte des Bathybius zu sein, und sich zu dessen nackten Urschleimstücken ebenso zu verhalten, wie die Kalknadeln oder Kieselnadeln eines Schwammes zu dessen lebendigen Zellen. Die geformten Kalkkörperchen des Bathybius sind deßhalb noch von besonderer Wichtigkeit, weil sie auch massenhaft versteinert vorkommen, und zwar in der weißen Kreide. Dadurch wird wiederum die längst aufgestellte Ansicht bestätigt, daß die Kreidelager Tiefseebildungen sind, verhärteter Schlamm, welcher in sehr bedeutenden Tiefen des offenen Oceans abgelagert wurde. Die Uebereinstimmung zwischen dem lebenden Bathybius-Schlamme und der fossilen Kreide wird dadurch vollständig, daß auch die Kalkschalen der Globigerinen neben den Coccolithen und Coccosphären zu den Hauptbestandtheilen der Kreide gehören. Mit anderen Worten: der Bathybius-Schlamm, welcher noch heutzutage den Boden unserer größten Meerestiefen bedeckt, ist in Bil-

dung begriffene Kreide. Die Organismen aber, welche diese moderne Kreide bilden, sind weder Thiere noch Pflanzen, sondern lediglich Protisten.

Wenn man diese merkwürdigen Verhältnisse der lebendigen Tiefsee-Bevölkerung in eingehendere Erwägung zieht, so drängen sich eine Menge von bedeutsamen Fragen auf. Sei es mir schließlich gestattet, in Kürze noch auf zwei von diesen Fragen hinzuweisen, auf die Fragen von der Ernährung und von der Entstehungs-Weise derselben.

Die Ernährung des Bathybius und der übrigen Protisten, welche die Abgründe des Oceans zwischen 3000 und 30,000 Fuß beleben, erscheint außerordentlich räthselhaft. Bekanntlich besteht zwischen Thier- und Pflanzen-Reich im Großen und Ganzen in der Ernährungsweise ein durchgreifender Gegensatz, in der Art, daß beide organische Reiche sich gegenseitig ergänzen und in der Oekonomie der Natur das Gleichgewicht halten. Die Pflanzen besitzen meistens die Fähigkeit, aus sogenannten anorganischen Verbindungen, nämlich aus Wasser, Kohlensäure und Ammoniak, durch Sauerstoff-Entbindung und Syntheſe eiweißartige Stoffverbindungen, und vor allem Protoplasma zusammen zu setzen. Diese Fähigkeit besitzen die Thiere nicht. Vielmehr müssen sie das Protoplasma oder den Urschleim, den sie nothwendig für ihr Leben brauchen, direct oder indirect aus dem Pflanzenkörper beziehen. Das Thierleben setzt also eigentlich überall schon das Pflanzenleben voraus.

Wenn wir nun, eingedenk dieses fundamentalen Wechselverhältnisses, die Oekonomie des Meereslebens in Betracht ziehen, so begegnen wir zunächst der befremdenden Thatsache, daß gerade das Pflanzenleben schon in verhältnißmäßig geringer Tiefe gänzlich aufhört. Während die Seethiere massenhaft bis zu 3000 Fuß Tiefe hinabgehen, und einzelne auch noch tiefer, so scheint dagegen

das Pflanzenleben in der Regel schon bei 2000 Fuß völlig zu verschwinden. Man nimmt nun an, daß die unterhalb dieser Zone vorkommenden Thiere sich von den unsichtbar kleinen Theilchen von zersetzter organischer Substanz ernähren, die allenthalben im Meereswasser vertheilt sind. In der That ist das Seewasser, besonders in der Nähe der Küsten, keineswegs eine reine Salzlösung, sondern vielmehr eine Art von sehr dünner Brühsuppe. Denn von den zahllosen Thieren und Pflanzen, die täglich im Meere sterben, vertheilt sich immer ein kleinerer oder größerer Bruchtheil der Körpersubstanz, der nicht von anderen Thieren sogleich verzehrt wird, im Wasser. Wenn man nun aber auch seine Phantasie noch so sehr anstrengt, um sich das Meerwasser in der Nähe der Küsten als eine leidlich nahrhafte Bouillon vorzustellen, so gilt das doch keineswegs für den offenen Ocean und besonders für dessen tiefste Abgründe. Gerade hier aber fanden wir jenes wunderbar üppige Protistenleben, jene ungeheuren Protoplasma-Haufen des Bathybius und der Globigerinen. Daß diese alle sich allein von jener homöopathisch verdünnten Brühe, in der vielleicht auf hundert Millionentheile Wasser nur ein Theil organischer Substanz kommt, sollten ernähren können, erscheint bei nüchterner Erwägung aller hier einschlagenden Verhältnisse sehr unwahrscheinlich.

Wenn demnach einerseits die Ernährung des Bathybius-Schlammes durch die im Wasser aufgelöste minimale Quantität von organischer Substanz kaum glaublich erscheint, andrerseits aber die Ernährung jener ansehnlichen Protoplasma-Massen durch Pflanzen bei dem gänzlichen Mangel von Vegetation gänzlich ausgeschlossen wird, so bleibt kaum noch etwas Anderes übrig, als die Annahme, daß die freien Urschleim-Körper des Bathybius sich an Ort und Stelle unter dem Einflusse der eigenthümlichen hier waltenden Existenz-Bedingungen aus anorganischer Substanz bilden;

mit anderen Worten, daß sie durch Urzeugung entstehen. Vielleicht leitet uns die Entdeckung des Bathybius auf die lange gesuchte Spur von der spontanen, mechanischen Entstehung des Lebens. Theoretisch hat diese tiefgreifende biologische Grundfrage keine Schwierigkeiten mehr, seitdem die neuere Biologie den durchgreifenden Beweis von der Einheit der organischen und der anorganischen Natur geführt hat, und seitdem insbesondere die Moneren die letzten hier noch bestehenden Schwierigkeiten aus dem Wege geräumt haben.[8]) Vielleicht ist in dem Bathybius bereits ein Organismus gefunden, der durch Zusammensetzung von Kohlenstoff, Sauerstoff, Wasserstoff und Stickstoff in bestimmten verwickelten Verhältnissen freies Protoplasma bildet, der also durch Urzeugung oder Archigonie, auf rein mechanischem Wege, sich selbst erzeugt. Wenigstens ließe sich diese Annahme gerade hier eher, als bei jedem anderen, bisher bekannten Organismus mit triftigen Gründen stützen. Sollte diese Vermuthung richtig sein, so würde sie eine glänzende Bestätigung des mystischen, von Oken prophetisch ausgesprochenen Satzes enthalten: „Alles Organische ist aus Schleim hervorgegangen, ist Nichts als verschieden gestalteter Urschleim. Dieser Urschleim ist im tiefen Meere aus anorganischer Materie entstanden."

Erklärung des Titelbildes.

Eine kleine Probe von Bathybiusschlamm bei einer Vergrößerung von 280. (Vergl. S. 25.)

a. Lebendige Urschleimstücke (Protoplasma-Cytoden) des Bathybius, ohne Kalkkörperchen (Coccolithen ꝛc).

a 1, a 2, a 3, a 4. Vier verschiedene Bathybius-Stücke von einfacher unregelmäßiger Form (Protamoeben-Form) mit lappenförmigen Fortsätzen.

a 5, a 6. Zwei kugelige Bathybius-Stücke ohne Hülle (Plasmosphären).

a 7, a 8. Zwei kugelige Bathybius-Stücke mit weicher hautartiger Hülle oder Cyste (Plasmocysten).

a 9. Ein großes netzförmiges Bathybius-Stück, aus vielen dünnen verschmolzenen Protoplasma-Strängen zusammengesetzt (Plasmodium).

b. Lebendige Urschleimstücke (Protoplasma-Cytoden) des Bathybius mit Kalkkörperchen (Coccolithen ꝛc.).

b 1. Ein amoebenförmiges Bathybius-Stück mit einem Coccolithen.

b 2. Ein amoebenförmiges Bathybius-Stück mit zwei Coccolithen.

b 3. Ein großes amoebenförmiges Bathybius-Stück mit zahlreichen Coccolithen und einer Coccosphäre.

b 4. Ein großes netzförmiges Bathybius-Stück, aus vielen dünnen verschmolzenen Protoplasma-Strängen zusammengesetzt, mit zahlreichen Coccolithen.

c. Freie, zwischen den lebendigen Protoplasmastücken des Bathybius in großer Menge zerstreute Kalkkörperchen (Coccolithen und Coccosphären).

c 1. Vier Coccolithen.

c 2. Fünf Coccolithen.

c 3. Drei Coccolithen.

c 4. Zwei Coccolithen.

c 5. Zwei Coccosphären.

d. Eine Diatomee (Coscinodiscus) mit kreisrunder scheibenförmiger wabiger Kieselschale.

e, f. Radiolarien oder radiäre Rhizopoden aus der Protistenklasse der Wurzelfüßer, mit gitterförmig durchbrochener Kieselschale.

e. Eucyrtidium, ein Radiolar aus der Gruppe der Cyrtiden. Die Kieselschale besteht aus sechs hinter einander liegenden ringförmigen Kammern, von denen die erste die kleinste und mit einem Kieselstachel besetzt ist, wie eine Pickelhaube. (Vergl. meine Monographie der Radiolarien, S. 319.)

f. Haliomma, ein Radiolar aus der Familie der Ommatiden. Die Kieselschale besteht aus einer doppelten Gitterkugel (einer inneren und einer äußeren). Die äußere Gitterschale ist mit sechs radialen Stacheln besetzt. Vergl. meine Monographie der Radiolarien, S. 425.)

g. Globigerinen, Polythalamien aus der Protistenklasse der Wurzelfüßer, mit poröser vielkammeriger Kalkschale.

g 1. Eine dünnschalige Globigerina mit 6 Kammern.

g 2. Eine dünnschalige Globigerina mit 8 Kammern.

g 3. Eine dünnschalige Globigerina mit 8 Kammern.

g 4. Eine dünnschalige Globigerina mit 10 Kammern.

g 5. Eine dünnschalige Globigerina mit 13 Kammern.

g 6. Eine dickschalige Globigerina mit 10 Kammern.

h. Einzelne abgelöste Kammern von Globigerinen, sogenannte Orbuliner.

h 1. Ein dünnschalige Orbulina.

h 2. Eine dickschalige Orbulina.

h 3. Ein Stück Kammerwand von einer dickschaligen Orbulina.

i. Textilaria, eine kalkschalige Polythalamie mit zweizeilig aufgereihten Kammern.

m. Mineralische Bestandtheile des Bathybius-Schlammes, kleine Bruchstücke von zertrümmerten Gesteinen ꝛc.

Anmerkungen und Citate.

1) Das „biogenetische Grundgesetz", oder das allgemein gültige Entwickelungsgesetz von dem ursächlichen Zusammenhang zwischen der Entwickelung jedes organischen Individuums und der Formenreihe seiner Vorfahrenkette, habe ich ausführlich erörtert und begründet in meiner „Natürlichen Schöpfungsgeschichte" (Gemeinverständliche wissenschaftliche Vorträge über die Entwickelungslehre im Allgemeinen und diejenige von Darwin, Goethe und Lamarck im Besonderen, über die Anwendung derselben auf den Ursprung des Menschen und andere damit zusammenhängende Grundfragen der Naturwissenschaft). II. Auflage. Berlin 1870. Nach diesem biogenetischen Grundgesetze können wir aus der Formenreihe, die jeder Organismus während seines individuellen Lebens vom Ei bis zum Tode durchläuft, uns eine ungefähre Vorstellung von den verschiedenen Formen machen, welche die Vorfahren desselben im Laufe vieler Jahrtausende angenommen haben. Wie man demgemäß auch von den verschiedenen thierischen Vorfahren des Menschengeschlechts sich ein annähernd richtiges Bild verschaffen kann, haben zwei frühere Vorträge dieser Sammlung gezeigt. (III. Serie, Heft 52 und 53: Ueber die Entstehung und den Stammbaum des Menschengeschlechts.) Die Gesetze der Vererbung und der Anpassung, und die zwischen diesen beiden Funktionen beständig stattfindende Wechselwirkung sind die einzige Ursache jenes realen Causalnexus zwischen Ontogenesis und Phylogenesis.

2) Die ausführlicheren Resultate meiner mikroskopischen und chemischen Untersuchung des Bathybius-Schlammes, durch zahlreiche Abbildungen erläutert, habe ich in den „Beiträgen zur Plastidentheorie“ mitgetheilt, welche in meinen „Biologischen Studien“ (Leipzig, 1870; mit 6 Kupfertafeln) enthalten sind. Die Leser dieses Vortrages, welche dem Gegenstande ein tieferes Interesse abgewinnen, finden dort namentlich die weitreichenden Folgerungen, welche sich an den Bathybius-Schlamm für die wichtigsten Fragen der Biologie knüpfen, eingehend erörtert.

3) Die außerordentlich formenreiche und interessante Klasse der Wurzelfüßer oder Rhizopoden ist uns erst in den letzten zwanzig Jahren genauer bekannt geworden. Sie lebt größtentheils im Meere, nur einige Arten kommen im süßen Wasser vor. Die Klasse besteht aus drei Ordnungen, den ganz einfach organisirten und meist mit einer Kalkschale versehenen Acyttarien, den höher entwickelten, meist mit Kieselschale gepanzerten Radiolarien, und der kleinen zwischen beiden Ordnungen in der Mitte stehenden Ordnung der nackten Heliozoen (Actinosphaerium Eichhornii, Cystophrys Haeckeliana etc.). Vergl. den 16. Vortrag meiner „Natürlichen Schöpfungsgeschichte“ (II. Aufl. S. 386—391). Die Ordnung der Acyttarien zerfällt in die beiden Unterordnungen der Einkammerigen (Monothalamia) und der Vielkammerigen (Polythalamia). Die letzteren sind besonders dadurch von großer Bedeutung, daß ihre zierlichen Kalkschalen einen großen Theil des Meeressandes und Grundschlammes zusammensetzen. Wenn dieser im Laufe von Jahrtausenden zu festem Gestein verdichtet ist und dann in Folge geologischer Vorgänge als neues Gebirge über die Meeresoberfläche gehoben wird, so erscheinen die Polythalamien-Schalen als Hauptbestandtheile der Gebirgsmassen (so z. B. im Nummulitenkalk, Miliolidenkalk u. s. w.). Die Naturgeschichte dieser gebirgsbildenden kleinen Organismen ist uns vorzüglich durch die sorgfältigen Untersuchungen des ausgezeichneten Bonner Anatomen Max Schultze bekannt geworden (Der Organismus der Polythalamien. Leipzig, 1854).

4) Unter allen Organismen dürfte die Rhizopoden-Ordnung der Radiolarien insofern als die formenreichste angesehen werden, als innerhalb derselben alle die verschiedenen geometrischen Grundformen vorkommen, die überhaupt von den Organismen gebildet werden. Die meisten dieser Kieselschalen sind durch ebenso zierliche als regelmäßige Gestalt und Architectur ausgezeichnet, und doch sind alle diese merkwürdigen Formen nur das Product formlosen Urschleims oder Protoplasmas. Eine Auswahl dieser Formen enthält der Atlas von 35 Kupfertafeln, welcher meine Monographie der Radiolarien begleitet (Berlin, 1862).

5) Die Unterscheidung des neutralen Protistenreiches, welches zwischen Thierreich und Pflanzenreich mitten inne steht und wahrscheinlich zugleich die gemeinsame Wurzel dieser beiden Reiche darstellt, habe ich zuerst in meiner „Generellen Morphologie“ durchgeführt (Berlin, 1862; I. Bd.

S. 215). Später habe ich in der „Monographie der Moneren" die Grenzen des Protistenreiches schärfer umschrieben und als vorzüglich charakteristisch für alle Protisten den gänzlichen Mangel geschlechtlicher Differenzirung und Zeugung hingestellt (Biologische Studien, I. Abschnitt). Vergl. auch den XVI. Abschnitt der „Natürlichen Schöpfungsgeschichte" (II. Aufl. S. 364).

6) Das Verhältniß der Zellen zu den Cytoden und ihre Zusammenfassung als Plastiden ist am ausführlichsten erörtert in meinen „Beiträgen zur Plastidentheorie" (Biologische Studien, II. Abschnitt). Die Natur der Zellen als selbstständiger Elementar-Organismen oder „Individuen erster Ordnung", welche den Kern der von Schleiden und Schwann 1839 aufgestellten „Zellentheorie" bildet, ist später vorzüglich von Brücke, Virchow und Max Schultze sehr eingehend gewürdigt worden. Vergl. namentlich Rud. Virchow: Vier Reden über Leben und Kranksein. Berlin, 1864. Vergl. ferner meine Tectologie oder Individualitätslehre (im dritten Buche der „Generellen Morphologie" Bd. I, S. 239).

7) Die ausführliche Beschreibung und Abbildung aller bisher beobachteten Moneren enthält meine „Monographie der Moneren" und die Nachträge zu derselben (Biologische Studien, I. und IV. Abschnitt, Taf. I—III und VI.). Kürzere Notizen darüber enthält der VIII. und der XVI. Abschnitt der „Natürlichen Schöpfungsgeschichte" (II. Aufl. S. 165 und 365). Das erste Moner, dessen ganze Naturgeschichte im Zusammenhange verfolgt wurde, ist der 1864 von mir bei Nizza beobachtete Protogenes primordialis. Werthvolle Beiträge zur Naturgeschichte der Moneren (Vampyrella und Protomonas) hat außerdem besonders Cienkowski geliefert (in Max Schultze's Archiv für mikroskopische Anatomie, I. Bd.).

8) Die Frage von der Urzeugung oder Archigonie (Generatio spontanea oder aequivoca), welche schon im Alterthum von vielen Philosophen erörtert und von den consequentesten Denkern als nothwendiges Postulat der monistischen oder einheitlichen Weltanschauung hingestellt wurde, ist durch die biologischen Fortschritte des letzten Decenniums wieder in den Vordergrund gedrängt und vielfach besprochen worden. Ein früherer Vortrag dieser Sammlung hat dieselbe ausführlich behandelt (August Müller: Ueber die erste Entstehung organischer Wesen und ihre Spaltung in Arten. I. Serie, Heft 13). Daß negative Experimente nicht im Stande sind, die ganze Frage negativ zu beantworten, und daß überhaupt der Schwerpunkt der Frage nicht auf dem Gebiete der experimentellen Empirie, sondern auf dem der consequenten Philosophie liegt, habe ich in meinen Untersuchungen über Urzeugung nachgewiesen (Generelle Morphologie, 1866. VI. Capitel, S. 167; Monographie der Moneren; und Natürliche Schöpfungsgeschichte, II. Aufl. S. 301).

In demselben Verlage erschienen:

Ueber

die Entstehung und den Stammbaum des Menschengeschlechts.

Zwei Vorträge

von

Dr. Ernst Haeckel,
Professor in Jena.

Zweite verbesserte Auflage.

1870. Preis 15 Sgr.

Ueber

Arbeitstheilung

in

Natur- und Menschenleben.

Von

Dr. Ernst Haeckel,
Professor an der Universität zu Jena.

Mit 1 Titelbild in Kupferstich und 18 Holzschnitten.

1869. Preis 10 Sgr.

Druck von Gebr. Unger (Th. Grimm) in Berlin, Friedrichsstraße 24.

COUNTWAY LIBRARY
HC 2QMF 8

L0062
Das Leben in den grossten Meere1870
Countway Library AZL4570
3 2044 045 284 759



t.6082
Das Leben in den grossten Meere1870
Countway Library AZL4576
3 2044 045 284 759